



## Eine Auswahl vorwiegend heimischen Bäume & Großsträucher für Privatgärten und innerstädtische Grünflächen

| Art  | Höhe (m) | Anmerkungen | Freie Natur* |
|--|----------|-------------|--------------|
| <i>Acer campestre</i> (Feld-Ahorn)                             | 10-20    | TW          | x            |
| <i>Acer monspessulanum</i> (Französischer Ahorn, Burgen-Ahorn) | 5-10     | TW          |              |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> (Berg-Ahorn)                        | bis 30   |             | x            |
| <i>Alnus glutinosa</i> (Schwarz-Erle)                          | 20-30    |             | x            |
| <i>Carpinus betulus</i> (Hainbuche)                            | 5-25     | TW          | x            |
| <i>Castanea sativa</i> (Eßkastanie)                            | bis 35   |             | x            |
| <i>Cornus mas</i> (Kornelkirsche)                              | 3-5      | TW          |              |
| <i>Corylus avellana</i> (Gewöhnl. Haselnuss)                   | 4-6      |             | x            |
| <i>Crataegus laevigata</i> (Zweigrifflicher Weißdorn)          | 2-6      |             | x            |
| <i>Crataegus monogyna</i> (Eingrifflicher Weißdorn)            | 2-6      |             | x            |
| <i>Fagus sylvatica</i> (Gewöhnliche Buche)                     | bis 40   |             | x            |
| <i>Fraxinus excelsior</i> (Gewöhnliche Esche)                  | bis 40   | TW          | x            |
| <i>Fraxinus ornus</i> (Blumenesche)                            | 10-15    | TW, N       |              |
| <i>Malus sylvestris</i> (Wildapfel)                            | 10-20    | TW          |              |
| <i>Mespilus germanica</i> (Mispel)                             | bis 6    | TW          |              |
| <i>Ostrya carpinifolia</i> (Hopfenbuche)                       | 15-25    | TW, N       |              |
| <i>Populus tremula</i> (Zitter-Pappel, Espe)                   | bis 20   | TW          |              |
| <i>Prunus avium</i> (Vogel-Kirsche)                            | 15-20    |             | x            |
| <i>Prunus mahaleb</i> (Felsenkirsche)                          | 2-6      | TW          |              |
| <i>Prunus padus</i> (Gewöhnliche Trauben-Kirsche)              | 6-10     |             | x            |
| <i>Pyrus pyrastrer</i> (Wildbirne)                             | 10-20    | TW          |              |
| <i>Quercus cerris</i> (Zerr-Eiche)                             | 20-35    | TW, N       |              |
| <i>Quercus petraea</i> (Trauben-Eiche)                         | 30-40    | TW          | x            |
| <i>Quercus pubescens</i> (Flaum-Eiche)                         | 7-20     | TW, N       |              |
| <i>Quercus robur</i> (Stiel-Eiche)                             | bis 50   |             | x            |
| <i>Salix alba</i> (Silber-Weide, Kopf-Weide)                   | bis 35   |             | x            |
| <i>Salix caprea</i> (Sal-Weide)                                | 3-10     |             | x            |
| <i>Salix cinerea</i> (Grau-Weide)                              | 3-6      |             | x            |
| <i>Salix fragilis</i> (Bruch-Weide)                            | 5-15     |             | x            |
| <i>Salix viminalis</i> (Korb-Weide)                            | 6-8      |             | x            |
| <i>Sambucus nigra</i> (Schwarzer Holunder)                     | 4-7      |             | x            |
| <i>Sorbus aria</i> (Mehlbeere)                                 | 4-10     | TW          |              |
| <i>Sorbus aucuparia</i> (Vogelbeere, Eberesche)                | 8-15     |             | x            |
| <i>Sorbus domestica</i> (Speyerling)                           | 10-20    | TW          |              |
| <i>Sorbus torminalis</i> (Elsbeere)                            | 10-20    | TW          |              |
| <i>Tilia cordata</i> (Winter-Linde)                            | 20-30    | TW          | x            |
| <i>Tilia platyphyllos</i> (Sommer-Linde)                       | 20-40    | TW          |              |
| <i>Ulmus minor/campestre</i> (Feld-Ulme)                       | 10-30    | TW          | x            |

\*Arten, die mit x gekennzeichnet sind, dürfen aus gebietsheimischen Herkünften auch in der freien Natur gepflanzt werden (Vorkommensgebiet 4, Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze, BfN, 2012).

Alle anderen Arten dürfen nur im Privatgarten und auf Grünflächen im besiedelten Bereich gepflanzt werden.

### Anmerkungen:

TW = Art nach aktueller Einschätzung für trockenwarme Standorte geeignet (klimafest). Referenzen: Naturgarten e.V., Peter Steiger (Natur & Garten 2.20), Ulrike Aufderheide (Natur & Garten 1.21)

N = Herkunft mittel-/süd-/südosteuropäisch, in Deutschland nicht heimisch (floraweb.de)

Eine ausführliche Beschreibung von Wildobst-Sorten z.B. für Streuobst-Wiesen ist in der Broschüre des Landschaftspflegeverbands MKK e.V. zu finden:

<https://www.lpv-mkk.de/news/index.php?rubrik=1&news=705415&typ=1>



## Eine Auswahl an vorwiegend heimischen Sträucher für Privatgärten und innerstädtische Grünflächen

| Art   | Höhe (cm) | Blütezeit | Blütenfarbe        | Anmerkungen | Freie Natur* |
|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|--------------|
| Amelanchier ovalis (Heimische Felsenbirne)              | 200-300   | IV-V      | weiß               | TW          |              |
| Berberis vulgaris (Berberitze, Sauerdorn)               | 200-300   | V-VI      | gelb               | TW          | x            |
| Chamaecytisus austriacus (Österreichischer Geißklee)    | 30-70     | VI-VIII   | gelb               | TW          |              |
| Chamaecytisus ratisbonensis (Regensburger Zwergginster) | 30-50     | IV-V      | gelb               | TW          |              |
| Chamaecytisus supinus (Kopf-Zwergginster)               | 50-80     | V-VIII    | gelb               | TW          |              |
| Colutea arborescens (Blasenstrauch)                     | 200-300   | VI-VIII   | gelb               | TW, N       |              |
| Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)                     | 200-350   | V-VI      | weiß               | TW          | x            |
| Cotoneaster integerrimus (Gewöhnliche Zwergmispel)      | 100-300   | IV-V      | weiß-hellrosa      | TW          |              |
| Cytisus nigricans (Schwarzer Geißklee)                  | 50-100    | VI-VIII   | gelb               | TW          |              |
| Cytisus scoparius (Besen-Ginster)                       | 100-200   | V-VI      | gelb               | TW          | x            |
| Daphne mezereum (Seidelbast)                            | 50-120    | III-IV    | rosa               |             |              |
| Euonymus europaeus (Europ. Pfaffenhütchen)              | 250-350   | V-VI      | weiß               |             | x            |
| Frangula alnus / Rhamnus frangula (Echter Faulbaum)     | 250-400   | IV-VIII   | grün-weiß          |             | x            |
| Genista germanica (Deutscher Ginster)                   | 20-60     | V-VIII    | gelb               | TW          |              |
| Genista tinctoria (Färberginster)                       | 30-70     | VII-IX    | gelb               | TW          |              |
| Herdera helix aboescens (Strauch-Efeu, Altersform)      | 50-100    | IX-XI     | grün-gelblich      |             |              |
| Hippocrepis emerus (Strauch-Kronwicke)                  | 100-200   | IV-VIII   | gelb               | TW          |              |
| Ligustrum vulgare (Liguster)                            | 250-350   | VI-VII    | weiß               | TW          | x            |
| Lonicera caerulea (Blaue Heckenkirsche)                 | 100-150   | V-VI      | gelblich           |             |              |
| Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)                 | 200-300   | V-VI      | hellgelb           | TW          | x            |
| Prunus spinosa (Gewönl. Schlehe, Schwarzdorn)           | 300-400   | III-IV    | weiß               | TW          | x            |
| Rhamnus cathartica (Echter Kreuzdorn)                   | 200-300   | V-VI      | grün               | TW          | x            |
| Ribes nigrum (Wilde Schwarze Johannisbeere)             | 80-150    | IV-V      | grünlich           |             |              |
| Ribes rubrum (Wilde Rote Johannisbeere)                 | 100-150   | IV-V      | grün-gelb          |             |              |
| Ribes uva-crispa (Wilde Stachelbeere)                   | 60-120    | IV-V      | rötlich-grün       |             |              |
| Rosa agrestis (Feld-Rose, Acker-Rose)                   | 100-200   | VI-VII    | weiß-blassrosa     | TW          |              |
| Rosa arvensis (Kriech-Rose)                             | 50-400    | VI-VII    | weiß               |             |              |
| Rosa canina (Hundsrose)                                 | 200-300   | V-VI      | rosa               | TW          | x            |
| Rosa corymbifera (Hecken-Rose, Busch-Rose)              | 100-200   | V-VI      | rosa               | TW          |              |
| Rosa gallica (Essigrose)                                | 50-100    | VI-VII    | rosa-purpur        | TW          |              |
| Rosa glauca (Bereifte Rose, Hechtrose)                  | 100-300   | VI-VII    | dunkelrosa         | TW          |              |
| Rosa majalis (Zimtrose)                                 | 100-200   | V-VI      | rosa               | TW          |              |
| Rosa micrantha (Kleinblütige Rose)                      | 100-200   | VI-VII    | hellrosa           | TW          |              |
| Rosa mollis (Weiche Rose)                               | 100-150   | VI-VII    | rosa-weiß          | TW          |              |
| Rosa pimpinellifolia/spinosissima (Bibernelle-Rose)     | 50-100    | V         | cremeweiß-hellgelb | TW          |              |
| Rosa rubiginosa (Weinrose)                              | 150-300   | VI-VII    | rosaweiß           | TW          |              |
| Rosa tomentosa (Filz-Rose)                              | 100-200   | VI        | weiß-rosa          | TW          |              |
| Rosa villosa/pomifera (Apfel-Rose)                      | 100-200   | V-VI      | weiß-rosa          | TW          |              |
| Salix aurita (Öhrchen-Weide)                            | 150-300   | IV-V      | gelblich           |             |              |
| Salix purpurea (Purpurweide)                            | 300-500   | IV-VI     | rot-gelb           |             | x            |
| Sambucus racemosa (Trauben-Holunder, Roter Holunder)    | 200-400   | III-V     | gelb               |             | x            |
| Viburnum lantana (Wolliger Schneeball)                  | 250-350   | IV-VI     | weiß               | TW          | x            |
| Viburnum opulus (Gewönl. Schneeball)                    | 250-350   | V-VI      | weiß               |             | x            |

\*Arten, die mit x gekennzeichnet sind, dürfen aus gebietsheimischen Herkünften auch in der freien Natur gepflanzt werden (Vorkommensgebiet 4, Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze, BfN, 2012).

Alle anderen Arten dürfen nur im Privatgarten und auf Grünflächen im besiedelten Bereich gepflanzt werden.

#### Anmerkungen:

TW = Art nach aktueller Einschätzung für trockenwarme Standorte geeignet (klimafest). Referenzen: Naturgarten e.V., Peter Steiger (Natur & Garten 2.20), Ulrike Aufderheide (Natur & Garten 1.21)

N = Herkunft mittel-/süd-/südosteuropäisch, in Deutschland nicht heimisch (floraweb.de)

Eine ausführliche Beschreibung von Wildobst-Sorten z.B. für Streuobst-Wiesen ist in der Broschüre des Landschaftspflegeverbands MKK e.V. zu finden:

<https://www.lpv-mkk.de/news/index.php?rubrik=1&news=705415&typ=1>